


# Dans la vie vie de tous les jours jours

Les seringues et aiguilles contaminées peuvent transmettre le virus.  
Si je trouve une seringue à l'école ou ailleurs je demande l'aide d'un adulte, du professeur, ou du gardien de l'immeuble.




Je ne partage pas ma brosse à dent.

À l'école un enfant séropositif peut et doit participer aux activités scolaires avec les copains.

Il n'y a pas de raison d'exclure les personnes atteintes. Au contraire il est indispensable de les entourer. Une personne touchée par une maladie grave doit pouvoir compter sur sa famille, son entourage et ses copains.



La solidarité et la fraternité permettent de mieux se défendre contre la maladie.



Je peux me protéger du SIDA, c'est possible, aujourd'hui c'est une preuve d'AMOUR !

# AMOUR

Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité  
Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées  
Direction Départementale des Affaires Sociales et Sociales de l'Essonne



D.D.A.S.S  
Immeuble France-Evry  
Tour Malte  
Boulevard de France  
91035 EVRY Cedex  
Tél : 01 69 36 71 71

diagonale  
Ile-de-France

20, avenue de la Terrasse  
91260 JUVISY-SUR-ORGE  
Tél. : 01 69 24 85 60  
Fax : 01 69 24 53 24  
E-mail : diagonale.idf@wanadoo.fr  
www.diagonale-idf.org  
FRANCE

12/2009  
Illustrations, conception et réalisation : A. Vuarnisson & G. de Montfond

# SIDA

S Syndrome  
I d'Immuno  
D Déficience  
A Acquis

Le virus du SIDA s'attaque aux défenses de l'organisme. Il peut être à l'intérieur des globules blancs et en prendre le commandement.

Le corps perd ses défenses, les maladies profitent de cet affaiblissement pour nous attaquer.

Les médicaments antiviraux (multithérapie) ne protègent pas du virus et ne guérissent pas encore du SIDA.

Les médicaments soulagent et prolongent la VIE.

Ils présentent un espoir certain pour les malades.

# Mortel Combat

# SIDA

# Ce qui peut transmettre



Le virus se transmet lors des relations amoureuses non protégées par un préservatif.



Il faut savoir que la pilule ne protège pas du SIDA, qu'il est possible d'attraper le SIDA lors de la première relation sexuelle, comme il est possible d'être enceinte la première fois.



De la mère à l'enfant pendant la grossesse si la mère est séropositive.



Les seringues et les aiguilles contaminées peuvent transmettre le virus.

# Ce qui ne transmet pas



Jouer ensemble



Soigner les animaux



Dormir avec une personne séropositive



Manger ensemble



S'asseoir avec quelqu'un



Habiter avec une personne qui a le virus du SIDA



Se donner la main




S'embrasser

# le SIDA



L'école



Aller chez le dentiste



Partager un savon



Utiliser les toilettes publiques



Téléphoner



Parler avec une personne séropositive



La piscine



Serrer une personne dans ses bras



Donner son sang



Les moustiques